

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Filariose sous-cutanée due à *Loa loa*, transmise par un taon.



Symptômes

Œdèmes sous-cutanés migrateurs (œdème de Calabar)

passage visible du ver sous la conjonctive



Complications

Encéphalopathie lors du traitement si forte charge parasitaire

néphropathie



Causes

Loa loa

transmission par piqûre de taon (*Chrysops*)



Traitement

Diéthylcarbamazine avec précautions

ivermectine contre-indiquée si forte parasitémie



Diagnostic différentiel

Autres maladies infectieuses fébriles de la zone tropicale



Examens paracliniques

NFS

bilan inflammatoire

sérologies ou PCR spécifiques

hémocultures si fièvre



Protocole médicamenteux

Diéthylcarbamazine avec précautions, ivermectine contre-indiquée si forte parasitémie



📄 **Interprétation des examens**

- Sérologie: IgM = infection récente
- PCR: haute sensibilité et spécificité
- résultat rapide



📄 **Prise en charge hospitalière**

- Prise en charge ambulatoire
- consultation de contrôle à 7-14 jours
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides



📄📄📄📄 **Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.