

Gravité MOYENNE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



Définition

Perte de contact permanente entre les surfaces articulaires de l'épaule, le plus souvent antérieure.



Symptômes

Douleur intense

déformation visible de l'épaule

impotence fonctionnelle complète



Causes

Traumatisme (chute

sport)

laxité capsulaire prédisposante



Complications

Récidives

lésion nerveuse (nerf axillaire)

instabilité chronique



Traitement

Réduction en urgence

immobilisation

rééducation

chirurgie si récidivante



Diagnostic différentiel

Autres causes traumatiques ou chirurgicales de présentation proche



Examens paracliniques

Radiographie ou scanner selon la localisation

bilan pré-opératoire standard



Protocole médicamenteux

Réduction en urgence, immobilisation, rééducation, chirurgie si récidivante



📄 Interprétation des examens

Interpréter l'imagerie en corrélation avec l'examen clinique et le mécanisme lésionnel



📄 Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



📄📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.