

Gravité FAIBLE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Issue d'un organe abdominal à travers un orifice naturel de la paroi inguinale.



Symptômes

Tuméfaction inguinale réductible

augmentée par l'effort et la toux

parfois douloureuse



Causes

Faiblesse congénitale ou acquise de la paroi abdominale

effort physique intense



Complications

Étranglement herniaire (urgence chirurgicale)

occlusion intestinale



Traitement

Chirurgie de cure herniaire (avec ou sans prothèse)

en urgence si étranglement



Diagnostic différentiel

Autres causes traumatiques ou chirurgicales de présentation proche



Examens paracliniques

Radiographie ou scanner selon la localisation

bilan pré-opératoire standard



Protocole médicamenteux

Chirurgie de cure herniaire (avec ou sans prothèse), en urgence si étranglement

Interprétation des examens

Interpréter l'imagerie en corrélation avec l'examen clinique et le mécanisme lésionnel

Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récides

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ Avertissement : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.