

Gravité MOYENNE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Remontée anormale des urines de la vessie vers l'uretère et le rein.



Symptômes

- Infections urinaires fébriles récurrentes chez l'enfant
- souvent découvert lors d'un bilan d'infection urinaire



Causes

- Anomalie congénitale de la jonction urétéro-vésicale



Complications

- Pyélonéphrites récurrentes
- cicatrices rénales
- insuffisance rénale à long terme



Traitement

- Antibioprophylaxie
- surveillance
- chirurgie anti-reflux si sévère



Diagnostic différentiel

- Autres pathologies pédiatriques ou malformatives de présentation proche



Examens paracliniques

- Examen clinique pédiatrique complet
- bilan biologique et imagerie selon contexte



Protocole médicamenteux

Antibioprophylaxie, surveillance, chirurgie anti-reflux si sévère



📄 Interprétation des examens

Interpréter selon les courbes de croissance et les normes pédiatriques spécifiques à l'âge



📄 Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi



📄📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.