

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Cancer des voies biliaires.

## Symptômes

Ictère progressif prurit amaigrissement

douleur

## Causes

Cholangite sclérosante lithiase

parasites (clonorchis)

## Complications

Métastases insuffisance hépatique cholangite

## Traitement

Chirurgie si résécable chimio gemcitabine-cisplatine

## Diagnostic différentiel

Cancer pancréas lithiase hépatomégalie métastatique sténose bénigne

## Examens paracliniques

IRM biliaire (MRCP) scanner biopsie (brossage CPRE) CA 19-9 bilan hépatique

## Protocole médicamenteux

Résécable: Chirurgie + Capécitabine adjuvant 6 mois; Non résécable: Gemcitabine 1000mg/m<sup>2</sup> + Cisplatine 25mg/m<sup>2</sup> J1+J8/21j; Drainage biliaire (stent)

## ☐ Interprétation des examens

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolysse

GGT/PAL élevées = cholestase

TP<70% = insuffisance hépatique

Scanner: Interpréter avec le contexte clinique

Rechercher collections

masses

épanchements

pneumopéritoine

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication

Gadolinium si tumeur/inflammation

## ☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.