

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Transit ralenti >3 mois.

● Symptômes

<3 selles/semaine

efforts poussée

sensation vidange incomplète

● Causes

Sédentarité

fibres insuffisantes

médicaments

hypothyroïdie

● Complications

Fécalome

fissure

hémorroïdes

● Traitement

Fibres

hydratation

laxatifs osmotiques

● Diagnostic différentiel

Cancer colorectal

hypothyroïdie

Hirschsprung

neuropathie

SII

● Examens paracliniques

Pas d'examen si fonctionnel

Coloscopie si >50 ans ou signes alarme

TSH

Temps transit colique si résistant

● Protocole médicamenteux

Fibres 25-30g/j + Hydratation 1.5L/j; Macroglol (Movicol) 1-3 sachets/j; Si échec: Bisacodyl 5mg/j ou Prunalopride 2mg/j; Rééducation périnéale si dyschésie

☐ Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique

Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.