

☐ **Gravité GRAVE**

⚡ **URGENCE**

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

● ☐ **Définition**

Méningite fongique opportuniste chez VIH avancé.

● ☐ **Symptômes**

Céphalées progressives

fièvre modérée

confusion

● ☐ **Causes**

Cryptococcus neoformans

CD4<100

pigeons

● ⚠ **Complications**

Hypertension intracrânienne

cécité

coma

décès

● ☐ **Traitement**

Amphotéricine B + flucytosine puis fluconazole

● ☐ **Diagnostic différentiel**

Méningite tuberculeuse

toxoplasmose

lymphome cérébral

● ☐ **Examens paracliniques**

PL (pression élevée)

encre de Chine(+)

antigène cryptococcique sang/LCR

culture

● ☐ **Protocole médicamenteux**

Amphotéricine B liposomale 3-4mg/kg/j + Flucytosine 100mg/kg/j 2 semaines; puis Fluconazole 400mg/j 8 semaines; puis 200mg/j maintenance; PL évacuatrices si HTIC

☐ Interprétation des examens

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.