

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Coagulation intravasculaire disséminée.



## Symptômes

Hémorragies diffuses ET thromboses

purpura

défaillance organes



## Causes

Sepsis

cancer

obstétrique

traumatisme

morsure serpent



## Complications

Défaillance multiviscérale

hémorragie massive

décès



## Traitement

Traitement cause

transfusion PFC/plaquettes

héparine si thrombose



## Diagnostic différentiel

PTI

PTT

SHU

insuffisance hépatique



## Examens paracliniques

TP/TCA allongés

fibrinogène bas

D-dimères élevés

plaquettes basses

schizocytes



## Protocole médicamenteux

Traiter la cause en urgence; PFC 15ml/kg si hémorragie + TP<40%; Fibrinogène 3g IV si <1g/L; Plaquettes si <20000 + hémorragie; Héparine si thrombose prédominante

## ☐ Interprétation des examens

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

## ☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.