

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Bouton de fièvre par HSV-1.

## Symptômes

Picotements puis vésicules en bouquet sur lèvre

croûtes

## Causes

HSV-1

réactivation stress/soleil/fièvre

## Complications

Kératite herpétique

eczéma herpeticum rare

## Traitement

Aciclovir crème

valaciclovir oral si fréquent

## Diagnostic différentiel

Impétigo

aphte

zona

chancre syphilitique

dermatite herpétiforme

## Examens paracliniques

Clinique

PCR HSV si doute

Tzanck

## Protocole médicamenteux

Aciclovir crème 5% x5/j 5j dès prodromes; Si >6 récurrences/an: Valaciclovir 500mg/j préventif; Protection solaire lèvres

## Interprétation des examens

PCR: Détection ADN/ARN pathogène

Haute sensibilité et spécificité

Résultat rapide

Charge virale si quantitative

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire      consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.