

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

Définition

Tumeur bénigne tissu adipeux fréquente.

Symptômes

Masse sous-cutanée molle indolore mobile

croissance lente

Complications

Compression nerveuse rare

liposarcome exceptionnel

Causes

Prolifération adipocytaire

prédisposition familiale

Traitement

Abstention ou exérèse chirurgicale si gênant

Diagnostic différentiel

Kyste sébacé

dermatofibrome

liposarcome

neurofibrome

Examens paracliniques

Clinique

échographie si profond

IRM si volumineux ou douloureux (éliminer liposarcome)

Protocole médicamenteux

Abstention si asymptomatique; Exérèse chirurgicale si >5cm, douloureux ou croissance rapide; Liposuccion possible si superficiel; Histologie systématique

☐☐ Interprétation des examens

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication

Gadolinium si tumeur/inflammation

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux

☐☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie

bilan pré-op

jeûne

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.