

Gravité **MOYENNE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Infection aiguë de la prostate.

● Symptômes

Fièvre élevée frissons dysurie
douleur périnéale TR douloureux

● Causes

E. coli Klebsiella Proteus IST parfois

● Complications

Abcès prostatique sepsis prostatite chronique

● Traitement

Fluoroquinolone ou C3G + aminoside

● Diagnostic différentiel

Pyélonéphrite cystite orchite cancer prostate abcès périnéal

● Examens paracliniques

ECBU (pyurie + bactériurie) hémocultures NFS/CRP/PCT échographie prostatique endorectale
PSA (élevé transitoirement)

● Protocole médicamenteux

Ciprofloxacine 500mg x2/j PO 4-6 semaines; ou Ceftriaxone 2g/j IV + Gentamicine 5mg/kg/j si sévère; PAS de sondage vésical si possible;
Drainage abcès si >2cm

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

CRP/VS: CRP>5mg/L = inflammation

>100mg/L = infection bactérienne probable

VS accélérée si >20mm/h

Hémocultures: 3 paires aéro/anaérobie avant ATB

Positives = bactériémie

Identification + antibiogramme guide le traitement

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.