

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

Définition

Encéphalite virale mortelle transmise par morsure d'animal infecté.

Symptômes

Hydrophobie aérophobie agitation paralysie

phase prodromique

Causes

Virus rabique morsure de chien/chauve-souris infecté

Complications

Encéphalite fatale à 100% une fois symptômes apparus

Traitement

Prophylaxie post-exposition urgente (vaccin + immunoglobulines)

Diagnostic différentiel

Tétanos encéphalite virale botulisme syndrome de Guillain-Barré

Examens paracliniques

Clinique + notion de morsure RT-PCR salive biopsie cutanée nucale anticorps LCR

Protocole médicamenteux

PPE: Lavage plaie 15min + Vaccin antirabique J0-J3-J7-J14-J28 + Immunoglobulines 20UI/kg (infiltration locale) si catégorie III

Interprétation des examens

PCR: Détection ADN/ARN pathogène Haute sensibilité et spécificité Résultat rapide Charge virale si quantitative

☐☐ **Prise en charge hospitalière**

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.