

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

●

## Définition

Infection par *Clostridium tetani* avec neurotoxine causant spasmes musculaires.

●

## Symptômes

Trismus spasmes musculaires généralisés  
opisthotonos dysphagie

●

## Causes

*Clostridium tetani* plaie souillée  
accouchement non stérile

●

## Complications

Insuffisance respiratoire fractures arrêt cardiaque

●

## Traitement

Immunoglobulines métronidazole diazépam  
ventilation vaccination DTP

●

## Diagnostic différentiel

Tétanie hypocalcémique dystonie médicamenteuse méningite strychnine

●

## Examens paracliniques

Clinique (pas d'examen biologique fiable) abaisse-langue captif (signe du spatule)

●

## Protocole médicamenteux

Immunoglobulines antitétaniques 500UI IM; Métronidazole 500mg x3/j IV 7-10j; Diazépam 5-10mg IV si spasmes; Vaccination DTP (pas immunisant)

## ☐ Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique

Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

## ☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.