

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Trajet infectieux entre canal anal et peau péri-anele.

Symptômes

Écoulement purulent péri-anal douleur modérée

antécédent abcès

Causes

Infection glande d'Hermann-Desfosses

Complications

Récidive incontinence post-op

complexification trajet

Traitement

Chirurgie (fistulotomie séton LIFT lambeau)

Diagnostic différentiel

Crohn péri-anal tuberculose hidrosadénite cancer anal

Examens paracliniques

IRM périnéale (trajet fistuleux) classification Parks) écho-endoanale examen sous AG

Protocole médicamenteux

Fistule intersphinctérienne: Fistulotomie; Transsphinctérienne: Séton drainage 6-8 sem puis section; Complexe: Technique LIFT ou lambeau d'avancement; Crohn: Adalimumab + séton

☐ Interprétation des examens

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication

Gadolinium si tumeur/inflammation

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie

bilan pré-op

jeûne

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.