

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

Définition

Dermatophytose interdigitale.

Symptômes

Prurit macération fissures interdigitales
desquamation

Causes

Trichophyton rubrum humidité
chaussures fermées

Complications

Extension porte d'entrée érysipèle

Traitement

Antifongiques topiques séchage

Diagnostic différentiel

Eczéma psoriasis palmoplantaire érythrasma

Examens paracliniques

Clinique prélèvement mycologique si résistant

Protocole médicamenteux

Terbinafine crème 1% x1/j 1-2 semaines; Séchage soigneux; Chaussures aérées; Poudre antifongique prévention

☐ Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique

Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.