

Gravité FAIBLE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Abcès glande de Bartholin.



Symptômes

Tuméfaction douloureuse lèvres postérieures

fièvre

gêne marche



Causes

Polymicrobienne

gonocoque

anaérobies



Complications

Récidive

kyste résiduel



Traitement

Incision drainage

marsupialisation



Diagnostic différentiel

Kyste Bartholin

furoncle

herpès

cancer vulvaire



Examens paracliniques

Clinique

prélèvement bactériologique si IST suspectée

bilan IST



Protocole médicamenteux

Incision drainage + Marsupialisation sous AL; ATB: Amoxicilline-clavulanate 1g x3/j si fièvre; Exérèse glande si récurrences multiples

☐ Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique

Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.