

Gravité FAIBLE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Parasitose intestinale par *Ascaris lumbricoides*.

## Symptômes

Souvent asymptomatique    douleurs abdominales

toux (syndrome Löffler)

## Causes

*Ascaris lumbricoides*    ingestion œufs    péril fécal

## Complications

Occlusion intestinale    angiocholite    pancréatite

## Traitement

Albendazole dose unique

## Diagnostic différentiel

Allergie    asthme    occlusion autre cause

## Examens paracliniques

EPS (œufs)    NFS (éosinophilie)    radio ASP si occlusion

## Protocole médicamenteux

Albendazole 400mg PO dose unique; Mébendazole 100mg x2/j 3j en alternative; Chirurgie si occlusion; Assainissement+hygiène

## ☐☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

Radiographie: Interpréter systématiquement (ABCDE)

Rechercher opacités

épanchements

cardiomégalie

pneumothorax

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

## ☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.