

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Infection bactérienne des poumons par *Mycobacterium tuberculosis* transmise par voie aérienne.

## Symptômes

Toux persistante >2 semaines hémoptysie  
fièvre vespérale sueurs nocturnes  
amaigrissement

## Causes

*Mycobacterium tuberculosis* transmission aérogène  
immunodépression VIH malnutrition

## Complications

TB multirésistante méningite tuberculeuse  
miliaire insuffisance respiratoire

## Traitement

RHZE 2 mois puis RH 4 mois DOT vaccin BCG

## Diagnostic différentiel

Pneumonie bactérienne cancer poumon sarcoïdose pneumocystose abcès pulmonaire

## Examens paracliniques

BK crachats (BAAR) GeneXpert MTB/RIF radiographie thoracique IDR tuberculine Quantiferon  
culture Löwenstein

## Protocole médicamenteux

Rifampicine 10mg/kg/j + Isoniazide 5mg/kg/j + Pyrazinamide 25mg/kg/j + Éthambutol 15mg/kg/j pendant 2 mois; puis R+H pendant 4 mois

## ☐ Interprétation des examens

Radiographie: Interpréter systématiquement (ABCDE)

Rechercher opacités

épanchements

cardiomégalie

pneumothorax

## ☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.