

Gravité MOYENNE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Fièvre ondulante par Brucella.



Symptômes

Fièvre ondulante sueurs nocturnes arthralgies
splénomégalie



Causes

Brucella melitensis (chèvre) abortus (bovin)
contact animaux/lait cru



Complications

Spondylodiscite endocardite neurobrucellose



Traitement

Doxycycline + rifampicine 6 semaines streptomycine



Diagnostic différentiel

Tuberculose fièvre typhoïde endocardite lymphome



Examens paracliniques

Hémocultures sérologie Wright/Rose Bengale NFS (leucopénie) ponction si spondylodiscite



Protocole médicamenteux

Doxycycline 100mg x2/j + Rifampicine 600-900mg/j 6 semaines; ou Doxycycline + Gentamicine 5mg/kg/j IM 2-3 semaines;
Spondylodiscite: 3 mois minimum

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

Hémocultures: 3 paires aéro/anaérobie avant ATB

Positives = bactériémie

Identification + antibiogramme guide le traitement

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

Sérologie: IgM = infection récente/aiguë

IgG = infection ancienne/immunité

Séroconversion = passage IgM→IgG

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.