

Gravité **GRAVE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Mycose profonde par *Histoplasma capsulatum*.

## Symptômes

Forme pulmonaire pseudo-TB

forme disséminée si VIH

## Complications

Forme disséminée

insuffisance surrénale

pancytopénie

## Causes

*Histoplasma capsulatum*

bat/bird droppings

## Traitement

Itraconazole

amphotéricine B si sévère

## Diagnostic différentiel

Tuberculose

sarcoïdose

cancer poumon

pneumocystose

## Examens paracliniques

Antigène *Histoplasma* urinaire/sanguin

culture

biopsie (levures intracellulaires)

sérologie

## Protocole médicamenteux

Légère: Itraconazole 200mg x3/j 3j puis 200mg x2/j 12 mois; Sévère: Amphotéricine B liposomale 3mg/kg/j 2 sem puis Itraconazole 12 mois; VIH: Prophylaxie secondaire

## ☐☐ Interprétation des examens

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

Sérologie: IgM = infection récente/aiguë

IgG = infection ancienne/immunité

Séroconversion = passage IgM→IgG

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.