

Gravité **MOYENNE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Reflux sang vers VG par fuite valve aortique.



## Symptômes

Dyspnée palpitations souffle diastolique

élargissement différentielle



## Causes

Bicuspidie endocardite Marfan dissection

RAA



## Complications

Insuffisance cardiaque endocardite



## Traitement

Surveillance remplacement valvulaire



## Diagnostic différentiel

HTA CIV fistule coronaire canal artériel persistant



## Examens paracliniques

ETT (jet régurgitant volume régurgité DTDVG) ETO IRM cardiaque



## Protocole médicamenteux

IEC si HTA ou FEVG altérée; Remplacement valvulaire aortique si IA sévère + symptômes ou DTDVG>70mm ou FEVG<50%; Surveillance annuelle

## ☐ Interprétation des examens

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication

Gadolinium si tumeur/inflammation

## ☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

## ☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.