

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

● Définition

Ictère bénin par déficit UGT1A1.

● Symptômes

Ictère modéré intermittent fatigue

aggravé par jeûne/stress

● Causes

Déficit UGT1A1 autosomique récessif

5-8% population

● Complications

Aucune complication significative

● Traitement

Aucun traitement nécessaire assurance

● Diagnostic différentiel

Hémolyse hépatite maladie de Crigler-Najjar

● Examens paracliniques

Bilirubine non conjuguée modérément élevée (20-50 μ mol/L) bilan hépatique normal NFS normale

test au jeûne (augmentation bilirubine)

● Protocole médicamenteux

Aucun traitement nécessaire; Rassurance du patient; Éviter jeûne prolongé; Prudence avec certains médicaments (Irinotécan)

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse

GGT/PAL élevées = cholestase

TP<70% = insuffisance hépatique

☐☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.