

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Nécrose du muscle cardiaque par obstruction coronaire.



Symptômes

Douleur thoracique constrictive irradiant bras gauche/mâchoire

sueurs dyspnée



Causes

Athérosclérose coronaire tabac diabète

dyslipidémie



Complications

Insuffisance cardiaque arythmie

choc cardiogénique décès



Traitement

Angioplastie/stent en urgence aspirine+clopidogrel

thrombolyse



Diagnostic différentiel

Péricardite embolie pulmonaire dissection aortique spasme coronaire angor instable



Examens paracliniques

ECG 12 dérivations (sus-décalage ST) troponine coronarographie en urgence échographie cardiaque



Protocole médicamenteux

SAMU (1515): Aspirine 250mg IV + Clopidogrel 600mg + Héparine + Morphine; Angioplastie primaire <120min; ou Thrombolyse (Ténectéplase) si délai >120min

☐☐ Interprétation des examens

ECG: Rythme sinusal normal 60-100/min

Rechercher sus/sous-décalage ST

ondes Q

troubles conduction

hypertrophie

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux

☐☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.