

**Gravité GRAVE**

**URGENCE**

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave



## Définition

Séparation rétine sensorielle du pigmentaire.



## Symptômes

Phosphènes

myodésopsies

amputation champ visuel

voile noir



## Causes

Déchirure rétinienne

myopie forte

post-trauma/chirurgie



## Complications

Cécité permanente si non traité rapidement



## Traitement

Chirurgie urgente (vitrectomie

cerclage

laser)



## Diagnostic différentiel

Hémorragie vitréenne

décollement postérieur vitré

tumeur choroïdienne



## Examens paracliniques

Fond d'œil dilaté (rétine soulevée)

échographie oculaire mode B si trouble des milieux



## Protocole médicamenteux

Chirurgie urgente <24h si macula non décollée; Vitrectomie + Laser endoculaire + Tamponnement gaz/huile silicone; ou Cerclage scléral;  
Position post-op stricte



## Interprétation des examens

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux



**Prise en charge hospitalière**

- Admission urgences
- évaluation ABCDE
- monitoring continu (scope
- SpO2
- PA)
- Pose VVP x2 gros calibre
- bilan sanguin urgent
- groupage si hémorragie
- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée: constantes/4h
- diurèse horaire si critique
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives



**Protocole par tranche d'âge**

- NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute
- ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour
- ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

**Avertissement :** GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.