

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Piqûre de scorpion.

Symptômes

Douleur locale intense

sueurs

tachycardie

détresse respiratoire

Causes

Scorpions (Androctonus

Buthus)

zones arides Afrique

Complications

Choc cardiogénique

OAP

décès (enfant surtout)

Traitement

Sérum antiscorpionique

dobutamine

soins réa

Diagnostic différentiel

Allergie

myocardite

crise d'angoisse

Examens paracliniques

Clinique (classification Abroug I-III)

ECG

troponine

radio thoracique

Protocole médicamenteux

Grade I: Paracétamol + surveillance 4h; Grade II: Sérum antiscorpionique + Dobutamine 5-20µg/kg/min si myocardite; Grade III: Réanimation intensive; PAS de garrot

☐☐ Interprétation des examens

ECG: Rythme sinusal normal 60-100/min

Rechercher sus/sous-décalage ST

ondes Q

troubles conduction

hypertrophie

Radiographie: Interpréter systématiquement (ABCDE)

Rechercher opacités

épanchements

cardiomégalie

pneumothorax

☐☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope)

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.