

Gravité MOYENNE

URGENCE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Collection péri-anales douloureuse.

Symptômes

Douleur anale intense, tuméfaction, fièvre

insomnie

Causes

Infection cryptoglandulaire, anaérobies

Complications

Fistule anale secondaire (50%)

Traitement

Drainage chirurgical d'urgence

Diagnostic différentiel

Thrombose hémorroïdaire, fissure, Bartholin, hidrosadénite

Examens paracliniques

Clinique, échographie endoanale si profond

Protocole médicamenteux

Drainage chirurgical d'urgence sous AG ou AL; ATB si immunodéprimé: Amoxicilline-clavulanate; Surveillance fistule

Interprétation des examens

Échographie: Examen opérateur-dépendant, Rechercher collections, masses, dilatations, flux Doppler anormaux

☐☐ **Prise en charge hospitalière**

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ **Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.