

Gravité FAIBLE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Tumeur bénigne vasculaire du foie.

## Symptômes

Asymptomatique

douleur si volumineux

découverte fortuite

## Causes

Malformation vasculaire congénitale

## Complications

Rupture spontanée (exceptionnel)

syndrome de Kasabach-Merritt

## Traitement

Surveillance

chirurgie si >10cm symptomatique

## Diagnostic différentiel

Métastase hépatique

CHC

adénome

HNF

## Examens paracliniques

Échographie (hyperéchogène homogène)

IRM hépatique (rehaussement centripète)

scanner

## Protocole médicamenteux

Surveillance si asymptomatique et <5cm; Chirurgie (résection) si >10cm + symptômes; PAS de biopsie (risque hémorragie)

## ☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Interpréter avec le contexte clinique

Rechercher collections

masses

épanchements

pneumopéritoine

IRM: Meilleure résolution tissulaire

Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication

Gadolinium si tumeur/inflammation

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux

## ☐☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie

bilan pré-op

jeûne

## ☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.