

Gravité **MOYENNE**

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Douleur marche par AOMI.



Symptômes

Douleur mollet marche cédant au repos pieds froids



Complications

Ischémie critique gangrène amputation



Causes

Athérosclérose tabac diabète HTA



Traitement

Marche quotidienne arrêt tabac statine

revascularisation



Diagnostic différentiel

Sciatique canal lombaire étroit neuropathie



Examens paracliniques

IPS <0.9 écho-doppler artériel test de marche (périmètre)



Protocole médicamenteux

Arrêt tabac; Marche supervisée 30min x3/sem; Aspirine 75mg/j; Atorvastatine 80mg/j; IEC; Revascularisation si ischémie critique

☐ Interprétation des examens

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.