

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

PA>180/120 avec atteinte organe cible.



Symptômes

Céphalées violentes

troubles visuels

confusion

dyspnée

douleur thoracique



Causes

HTA sévère

arrêt traitement

cocaïne



Complications

AVC

OAP

dissection aortique

encéphalopathie



Traitement

Antihypertenseur IV

objectif -25% en 1h



Diagnostic différentiel

AVC

dissection

éclampsie

phéochromocytome



Examens paracliniques

PA bras

fond d'œil

ECG

troponine

créatinine

scanner si signes neuro



Protocole médicamenteux

Nicardipine 5→15mg/h IVSE; ou Labétalol 0.25-2mg/min IV; Objectif: baisse 25% en 1h; NE PAS normaliser brutalement

☐ Interprétation des examens

Créatinine: Élevée si >120 μ mol/L homme

>100 femme

Calculer DFG (CKD-EPI)

IRA si élévation aiguë

Scanner: Interpréter avec le contexte clinique

Rechercher collections

masses

épanchements

pneumopéritoine

ECG: Rythme sinusal normal 60-100/min

Rechercher sus/sous-décalage ST

ondes Q

troubles conduction

hypertrophie

☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.