

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

Définition

Infection profonde follicule pileux.

Symptômes

Nodule rouge douloureux induré bourbillon central

Complications

Furonculose récidivante anthrax (regroupement)

bactériémie

Causes

Staphylococcus aureus frottement diabète

Traitement

Antiseptique incision si mûr ATB si compliqué

Diagnostic différentiel

Kyste sébacé infecté hidrosadénite charbon

Examens paracliniques

Clinique prélèvement si récidivant (recherche SARM)

Protocole médicamenteux

Antiseptique chlorhexidine; PAS d'ATB si isolé; Incision drainage si fluctuant; ATB si: fièvre, péri-narinaire, immunodéprimé: Pristinamycine 1g x3/j 7j; Furonculose: Décolonisation Mupirocine nasale + chlorhexidine douche 5j/mois

☐ Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique

Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.