

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Inflammation de la langue.

Symptômes

Langue rouge douloureuse lisse (dépapillée)

brûlures

Causes

Carence fer/B12/folates candidose médicaments

sécheresse

Complications

Dysphagie dénutrition

Traitement

Traitement cause soins buccaux

Diagnostic différentiel

Cancer langue lichen plan pemphigus buccal allergie

Examens paracliniques

NFS ferritine B12 folates prélèvement si candidose

Protocole médicamenteux

Carence fer: Sulfate ferreux 200mg/j; B12: Injections 1000µg IM; Candidose: Fluconazole; Soins: Bains bouche bicarbonate; Éviter aliments épicés/acides

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

☐☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.