

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Manifestations après arrêt brutal alcool.



Symptômes

Tremblements sueurs anxiété hallucinations
convulsions delirium tremens



Causes

Arrêt brutal alcool chez dépendant



Complications

Delirium tremens convulsions décès



Traitement

Benzodiazépines vitamine B1 hydratation



Diagnostic différentiel

Hypoglycémie AVC méningite hyperthyroïdie toxiques



Examens paracliniques

Clinique (score CIWA-Ar) glycémie ionogramme bilan hépatique alcoolémie



Protocole médicamenteux

Thiamine (Vitamine B1) 500mg IV x3/j 3j AVANT glucose; Diazépam 10-20mg PO/IV puis titration selon score CIWA; Hydratation; Surveillance 72h minimum; Benzodiazépine décroissance 5-7j

☐ Interprétation des examens

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse

GGT/PAL élevées = cholestase

TP<70% = insuffisance hépatique

Ionogramme: Na 135-145 mmol/L

K 3.5-5 mmol/L

Hypo/hyponatrémie et kaliémie à corriger en urgence

☐ Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.