

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Dilatation veines spermaticques.

Symptômes

Pesanteur scrotale

veines palpables debout

douleur modérée

Causes

Insuffisance valvulaire veine spermaticque gauche (90%)

Complications

Infertilité (40% des infertilités masculines)

hypotrophie testiculaire

Traitement

Chirurgie si infertilité/douleur

embolisation

Diagnostic différentiel

Hernie inguinale

hydrocèle

tumeur testiculaire

kyste épididyme

Examens paracliniques

Échographie doppler scrotale (reflux Valsalva)

veines >3mm

spermogramme

Protocole médicamenteux

Surveillance si asymptomatique; Chirurgie (ligature sous-inguinale microchirurgicale) si: infertilité + anomalie spermogramme; ou douleur; Embolisation percutanée alternative

☐ Interprétation des examens

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie

bilan pré-op

jeûne

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.