◫◫ Gravité FAIBLE Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

◫◫ Définition

Mycose cutanée du jardinier

◫◫ Symptômes

Nodules lymphangitiques ascendants

ulcération

◫◫ Causes

Multifactoriel

prédisposition génétique

facteurs environnementaux

⚠ Complications

Complications locales et systémiques selon sévérité

◫◫ Traitement

Traitement médical et/ou chirurgical adapté

prise en charge multidisciplinaire

◫◫ Diagnostic différentiel

Autres pathologies de même localisation

causes infectieuses et inflammatoires

◫◫ Examens paracliniques

Bilan biologique standard (NFS

CRP)

imagerie adaptée (échographie

scanner

IRM)

examens spécialisés selon localisation

◫◫ Protocole médicamenteux

Traitement étiologique adapté; Traitement symptomatique; Surveillance clinique et paraclinique

Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme | <13 homme) | hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000) | thrombopénie (<150000) | CRP/VS: CRP>5mg/L = inflammation | >100mg/L = infection bactérienne probable | VS accélérée si >20mm/h | Scanner: Interpréter avec le contexte clinique | Rechercher collections | masses | épanchements | pneumopéritoine | IRM: Meilleure résolution tissulaire | Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication | Gadolinium si tumeur/inflammation | Échographie: Examen opérateur-dépendant | Rechercher collections | masses | dilatations | flux Doppler anormaux

Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire | consultation de contrôle à 7-14 jours | Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage | Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récidives | Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie | bilan pré-op | jeûne

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.