

Gravité GRAVE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Destruction irréversible du foie avec fibrose.



Symptômes

Fatigue ictère ascite angiomes stellaires

érythème palmaire



Causes

Alcool (70%) hépatite B/C NASH auto-immune



Complications

Hémorragie variqueuse ascite encéphalopathie

CHC décès



Traitement

Arrêt alcool traitement cause diurétiques

transplantation



Diagnostic différentiel

Insuffisance cardiaque droite péricardite constrictive syndrome de Budd-Chiari



Examens paracliniques

Bilan hépatique TP/facteur V FibroScan/FibroTest échographie/scanner FOGD (varices) alpha-fœtoprotéine

biopsie si doute



Protocole médicamenteux

Arrêt alcool total; Ascite: Spironolactone 75→400mg/j ± Furosémide 40→160mg/j; Encéphalopathie: Lactulose 30ml x3/j + Rifaximine 550mg x2/j; Varices: Propranolol 40-160mg/j

☐ Interprétation des examens

Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse

GGT/PAL élevées = cholestase

TP<70% = insuffisance hépatique

Scanner: Interpréter avec le contexte clinique

Rechercher collections

masses

épanchements

pneumopéritoine

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux

☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.