◫ Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

◫ Définition

Néphropathie extramembraneuse

◫ Symptômes

- Syndrome néphrotique
- protéinurie massive

◫ Causes

- Multifactoriel
- prédisposition génétique
- facteurs environnementaux

⚠ Complications

- Complications locales et systémiques selon sévérité

◫ Traitement

- Traitement médical et/ou chirurgical adapté
- prise en charge multidisciplinaire

◫ Diagnostic différentiel

- Autres pathologies de même localisation
- causes infectieuses et inflammatoires

◫ Examens paracliniques

- Bilan biologique standard (NFS
- CRP)
- imagerie adaptée (échographie
- scanner
- IRM)
- examens spécialisés selon localisation

◫ Protocole médicamenteux

Traitement étiologique adapté; Traitement symptomatique; Surveillance clinique et paraclinique

◫ Interprétation des examens

- NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme
- <13 homme)
- hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)
- thrombopénie (<150000)
- CRP/VS: CRP>5mg/L = inflammation
- >100mg/L = infection bactérienne probable
- VS accélérée si >20mm/h
- Scanner: Interpréter avec le contexte clinique
- Rechercher collections
- masses
- épanchements
- pneumopéritoine
- IRM: Meilleure résolution tissulaire
- Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication
- Gadolinium si tumeur/inflammation
- Échographie: Examen opérateur-dépendant
- Rechercher collections
- masses
- dilatations
- flux Doppler anormaux

◫ Prise en charge hospitalière

- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée: constantes/4h
- diurèse horaire si critique
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récidives
- Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie
- bilan pré-op
- jeûne

◫◫◫◫◫ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.