◫◫ Gravité GRAVE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

◫◫ Définition

Néphropathie extramembraneuse

◫◫ Symptômes

- Syndrome néphrotique
- protéinurie massive

◫◫ Causes

- Multifactoriel
- prédisposition génétique
- facteurs environnementaux

⚠ Complications

- Complications locales et systémiques selon sévérité

◫◫ Traitement

- Traitement médical et/ou chirurgical adapté
- prise en charge multidisciplinaire

◫◫ Diagnostic différentiel

- Autres pathologies de même localisation
- causes infectieuses et inflammatoires

◫◫ Examens paracliniques

- Bilan biologique standard (NFS
- CRP)
- imagerie adaptée (échographie
- scanner
- IRM)
- examens spécialisés selon localisation

◫◫ Protocole médicamenteux

Traitement étiologique adapté; Traitement symptomatique; Surveillance clinique et paraclinique

Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme <13 homme) hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000) thrombopénie (<150000) CRP/VS: CRP>5mg/L = inflammation >100mg/L = infection bactérienne probable VS accélérée si >20mm/h Scanner: Interpréter avec le contexte clinique Rechercher collections masses épanchements pneumopéritoine IRM: Meilleure résolution tissulaire Séquences T1/T2/FLAIR/Diffusion selon indication Gadolinium si tumeur/inflammation Échographie: Examen opérateur-dépendant Rechercher collections masses dilatations flux Doppler anormaux

Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité Surveillance rapprochée: constantes/4h diurèse horaire si critique Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récidives Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie bilan pré-op jeûne

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.