◫ Gravité GRAVE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

◫ Définition

Infection virale du foie par le VHB pouvant devenir chronique avec risque de cirrhose et cancer.

◫ Symptômes

- Fatigue
- nausées
- ictère
- urines foncées
- douleurs abdominales
- arthralgies

◫ Causes

- Virus hépatite B
- transmission sang
- sexuelle
- mère-enfant

⚠ Complications

- Hépatite chronique
- cirrhose
- carcinome hépatocellulaire
- insuffisance hépatique

◫ Traitement

- Ténofovir/entécavir au long cours
- interféron pégylé
- vaccination universelle 3 doses

◫ Diagnostic différentiel

- Hépatite A/C/E
- mononucléose
- leptospirose
- hépatite médicamenteuse
- cholangite

◫ Examens paracliniques

- AgHBs
- Anti-HBc
- Anti-HBs
- AgHBe
- charge virale VHB
- bilan hépatique
- échographie
- FibroScan

◫ Protocole médicamenteux

Ténofovir 300mg/j ou Entécavir 0.5mg/j si critères traitement; Interféron pégylé 180µg/sem 48 semaines; Vaccination 3 doses (0-1-6 mois)

◫ Interprétation des examens

- Bilan hépatique: ALAT/ASAT >3N = cytolyse
- GGT/PAL élevées = cholestase
- TP<70% = insuffisance hépatique
- Échographie: Examen opérateur-dépendant
- Rechercher collections
- masses
- dilatations
- flux Doppler anormaux

◫ Prise en charge hospitalière

- Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité
- Surveillance rapprochée: constantes/4h
- diurèse horaire si critique
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récidives

◫◫◫◫◫ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.