◫◫ Gravité GRAVE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

◫◫ Définition

Syndrome parkinsonien + dysautonomie

◫◫ Symptômes

- Parkinsonisme
- hypotension orthostatique
- troubles urinaires

◫◫ Causes

- Multifactoriel
- prédisposition génétique
- facteurs environnementaux

⚠ Complications

- Complications locales et systémiques possibles

◫◫ Traitement

- Traitement médical et/ou chirurgical adapté

◫◫ Diagnostic différentiel

- Diagnostic différentiel selon localisation et présentation clinique

◫◫ Examens paracliniques

- Bilan biologique (NFS
- CRP)
- imagerie adaptée
- examens spécialisés

◫◫ Protocole médicamenteux

Traitement étiologique et symptomatique adapté; Surveillance clinique

□□ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme <13 homme) hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000) thrombopénie (<150000) CRP/VS: CRP>5mg/L = inflammation >100mg/L = infection bactérienne probable VS accélérée si >20mm/h

□□ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité Surveillance rapprochée: constantes/4h diurèse horaire si critique Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récidives Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie bilan pré-op jeûne

□□□□□ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.