◫◫ Gravité MOYENNE Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

◫◫ Définition

Parasitose due aux schistosomes transmis par eau douce.

◫◫ Symptômes

- Dermatite cercarienne
- fièvre de Katayama
- hématurie

◫◫ Causes

- Schistosoma haematobium/mansoni
- mollusques eau douce

⚠ Complications

- Fibrose hépatique
- cancer vessie
- glomérulonéphrite

◫◫ Traitement

- Praziquantel dose unique

◫◫ Diagnostic différentiel

- Cystite
- glomérulonéphrite
- cancer vésical
- tuberculose urogénitale

◫◫ Examens paracliniques

- Examen parasitologique urines/selles (œufs)
- sérologie
- NFS (éosinophilie)
- échographie

◫◫ Protocole médicamenteux

Praziquantel 40mg/kg dose unique PO; S. japonicum: 60mg/kg en 2 prises; Traitement de masse en zone endémique

Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme <13 homme) hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000) thrombopénie (<150000) Échographie: Examen opérateur-dépendant Rechercher collections masses dilatations flux Doppler anormaux Sérologie: IgM = infection récente/aiguë IgG = infection ancienne/immunité Séroconversion = passage IgM→IgG

Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution Réévaluation clinique à 48-72h adaptation thérapeutique Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récidives

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.