

Gravité MOYENNE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave



Définition

Parasitose due aux schistosomes transmis par eau douce.



Symptômes

Dermatite cercarienne

fièvre de Katayama

hématurie



Complications

Fibrose hépatique

cancer vessie

glomérulonéphrite



Causes

Schistosoma haematobium/mansoni

mollusques eau douce



Traitement

Praziquantel dose unique



Diagnostic différentiel

Cystite

glomérulonéphrite

cancer vésical

tuberculose urogénitale



Examens paracliniques

Examen parasitologique urines/selles (œufs)

sérologie

NFS (éosinophilie)

échographie



Protocole médicamenteux

Praziquantel 40mg/kg dose unique PO; S. japonicum: 60mg/kg en 2 prises; Traitement de masse en zone endémique

☐☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux

Sérologie: IgM = infection récente/aiguë

IgG = infection ancienne/immunité

Séroconversion = passage IgM→IgG

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.