◫ **Gravité MOYENNE** Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

◫ Définition

Parasitose due aux schistosomes transmis par eau douce.

◫ Symptômes

- Dermatite cercarienne
- fièvre de Katayama
- hématurie

◫ Causes

- Schistosoma haematobium/mansoni
- mollusques eau douce

⚠ Complications

- Fibrose hépatique
- cancer vessie
- glomérulonéphrite

◫ Traitement

- Praziquantel dose unique

◫ Diagnostic différentiel

- Cystite
- glomérulonéphrite
- cancer vésical
- tuberculose urogénitale

◫ Examens paracliniques

- Examen parasitologique urines/selles (œufs)
- sérologie
- NFS (éosinophilie)
- échographie

◫ Protocole médicamenteux

Praziquantel 40mg/kg dose unique PO; S. japonicum: 60mg/kg en 2 prises; Traitement de masse en zone endémique

◫ Interprétation des examens

- NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme
- <13 homme)
- hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)
- thrombopénie (<150000)
- Échographie: Examen opérateur-dépendant
- Rechercher collections
- masses
- dilatations
- flux Doppler anormaux
- Sérologie: IgM = infection récente/aiguë
- IgG = infection ancienne/immunité
- Séroconversion = passage IgM→IgG

◫ Prise en charge hospitalière

- Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution
- Réévaluation clinique à 48-72h
- adaptation thérapeutique
- Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage
- Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récidives

◫◫◫◫◫ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.