

Gravité MOYENNE

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

Définition

Parasitose bénigne sauf fœtus et immunodéprimé.

Symptômes

Souvent asymptomatique

adénopathies

fièvre chez immunocompétent

Causes

Toxoplasma gondii

chat

viande peu cuite

Complications

Toxoplasmose congénitale

toxoplasmose cérébrale VIH

Traitement

Pyriméthamine + sulfadiazine

spiramycine si grossesse

Diagnostic différentiel

Lymphome

mononucléose

CMV

sarcoïdose

VIH

Examens paracliniques

Sérologie IgG/IgM toxoplasme

avidité IgG

PCR (liquide amniotique/sang)

scanner cérébral si VIH

Protocole médicamenteux

Immunocompétent: abstention; Grossesse séroconversion: Spiramycine 3g/j; Si infection fœtale: Pyriméthamine 50mg/j + Sulfadiazine 3g/j + Acide folinique 25mg/j; VIH: idem + prophylaxie secondaire

☐☐ Interprétation des examens

Scanner: Interpréter avec le contexte clinique

Rechercher collections

masses

épanchements

pneumopéritoine

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

Sérologie: IgM = infection récente/aiguë

IgG = infection ancienne/immunité

Séroconversion = passage IgM→IgG

PCR: Détection ADN/ARN pathogène

Haute sensibilité et spécificité

Résultat rapide

Charge virale si quantitative

☐☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.