

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave



Définition

Forme bulleuse d'impétigo par toxine staphylococcique.



Symptômes

Bulles flasques sur peau saine contenu purulent

collerette desquamative



Causes

S. aureus producteur de toxine exfoliatrice



Complications

Extension

SSSS chez nourrisson



Traitement

Antibiothérapie antistaphylococcique



Diagnostic différentiel

Pemphigus

brûlure

épidermolyse

Lyell



Examens paracliniques

Prélèvement bactériologique du liquide

NFS



Protocole médicamenteux

Céfalaxine 25-50mg/kg/j en 3 prises 7j; ou Pristinamycine 50mg/kg/j; Mupirocine pommade si localisé

☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.