

## Gravité GRAVE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



### Définition

MICI limitée au côlon et rectum.



### Symptômes

Diarrhée sanglante

douleurs abdominales

ténesme

urgences fécales



### Causes

Auto-immune

génétique

microbiote



### Complications

Colectomie

mégacôlon toxique

cancer colorectal



### Traitement

5-ASA

corticoïdes

azathioprine

anti-TNF

colectomie



### Diagnostic différentiel

Crohn colique

colite infectieuse

colite ischémique

cancer colorectal



### Examens paracliniques

Coloscopie + biopsies étagées

calprotectine fécale

coprocultures (éliminer infection)

NFS/CRP



### Protocole médicamenteux

Rectite: Mésalazine suppositoire 1g/j; Colite gauche: Mésalazine 4g/j PO + lavement; Poussée sévère: Méthylprednisolone 1mg/kg IV; Fond: Azathioprine ou Infliximab

## ☐ Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

CRP/VS: CRP>5mg/L = inflammation

>100mg/L = infection bactérienne probable

VS accélérée si >20mm/h

## ☐ Prise en charge hospitalière

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

## ☐☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.