

Gravité FAIBLE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave

Définition

Parasitose intestinale par Taenia.

Symptômes

Souvent asymptomatique troubles digestifs

anneaux dans les selles

Complications

T. solium: cysticercose (SNC)

Causes

Taenia saginata (bœuf) T. solium (porc)

viande mal cuite

Traitement

Praziquantel ou niclosamide dose unique

Diagnostic différentiel

Ascariose oxyurose giardiase SII

Examens paracliniques

EPS (anneaux œufs) scotch-test péri-anal

Protocole médicamenteux

Praziquantel 10mg/kg dose unique PO; ou Niclosamide 2g dose unique à jeun; Cuisson viande >60°C

☐ Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique

Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

☐ Prise en charge hospitalière

Prise en charge ambulatoire

consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récurrences

☐☐☐☐ Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement :** ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.