

Gravité FAIBLE

Source : Institut Pasteur

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Thrombose veineuse superficielle.

## Symptômes

Cordon veineux rouge douloureux induration

## Complications

Extension TVP embolie pulmonaire

## Diagnostic différentiel

Cellulite lymphangite érysipèle TVP

## Examens paracliniques

Écho-doppler veineux (thrombus extension?) D-dimères si suspicion TVP

## Protocole médicamenteux

AINS topique + Compression; Si >5cm ou proche jonction: Fondaparinux 2.5mg/j SC 45j; Écho-doppler contrôle 1 semaine

## Interprétation des examens

Ponction: Analyse cytologique biochimique et bactériologique LCR normal: <5 éléments protéines <0.4g/L  
glucose >2/3 glycémie

## Causes

Varices alitement cathéter thrombophilie

## Traitement

AINS compression HBPM si étendue

## ☐☐ **Prise en charge hospitalière**

Prise en charge ambulatoire      consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

## ☐☐☐☐☐ **Protocole par tranche d'âge**

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.