

**Gravité MOYENNE**

Source : OMS / WHO

FaibleMoyenneGrave

•

## ■ Définition

Augmentation volume prostate comprimant urètre.

•

## ■ Symptômes

Dysurie pollakiurie jet faible nycturie

sensation vidange incomplète

•

## ■ Causes

Vieillissement déséquilibre hormonal

•

## ⚠ Complications

Rétention aiguë insuffisance rénale calculs

•

## ■ Traitement

Alpha-bloquants inhibiteurs 5-alpha réductase

chirurgie

•

## ■ Diagnostic différentiel

Cancer prostate prostatite vessie neurologique sténose urétrale

•

## ■ Examens paracliniques

PSA toucher rectal échographie débitmétrie IPSS score créatinine

•

## ■ Protocole médicamenteux

Alpha-bloquant: Tamsulosine 0.4mg/j; Si prostate >40ml: + Finastéride 5mg/j ou Dutastéride 0.5mg/j; RTUP si échec médical ou complications



**📄 Interprétation des examens**

Créatinine: Élevée si >120µmol/L homme

>100 femme

Calculer DFG (CKD-EPI)

IRA si élévation aiguë

Échographie: Examen opérateur-dépendant

Rechercher collections

masses

dilatations

flux Doppler anormaux



**📄 Prise en charge hospitalière**

Hospitalisation courte durée ou surveillance ambulatoire selon évolution

Réévaluation clinique à 48-72h

adaptation thérapeutique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Évaluation pré-opératoire: consultation anesthésie

bilan pré-op

jeûne



**📄📄📄📄 Protocole par tranche d'âge**

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.