

Gravité GRAVE

URGENCE

Source : OpenFDA

FaibleMoyenneGrave



Définition

Polyradiculonévrite avec paralysie ascendante.



Symptômes

Faiblesse ascendante bilatérale

aréflexie

paresthésies

atteinte respiratoire



Causes

Post-infectieux (Campylobacter

grippe

Zika)

auto-immune



Complications

Paralysie respiratoire

dysautonomie

décès



Traitement

Immunoglobulines IV ou plasmaphérèses

réanimation



Diagnostic différentiel

Myélopathie

myasthénie

botulisme

neuropathie toxique

poliomyélite



Examens paracliniques

PL (dissociation albumino-cytologique)

EMG/VCN (démyélinisation)

spirométrie (CV)

NFS



Protocole médicamenteux

IgIV 0.4g/kg/j 5j; ou Plasmaphérèses 5 séances/10j; Ventilation mécanique si CV<15ml/kg; Prévention TVP: Enoxaparine 40mg/j; Rééducation précoce

Interprétation des examens

NFS: Rechercher anémie (Hb<12g/dL femme

<13 homme)

hyperleucocytose (>10000) ou leucopénie (<4000)

thrombopénie (<150000)

Ponction: Analyse cytologique

biochimique et bactériologique

LCR normal: <5 éléments

protéines <0.4g/L

glucose >2/3 glycémie

Prise en charge hospitalière

Admission urgences

évaluation ABCDE

monitoring continu (scope

SpO2

PA)

Pose VVP x2 gros calibre

bilan sanguin urgent

groupage si hémorragie

Hospitalisation en service spécialisé ou réanimation selon gravité

Surveillance rapprochée: constantes/4h

diurèse horaire si critique

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage

Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

Protocole par tranche d'âge

NOURRISSON (<2 ans): Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

ENFANT (2-15 ans): Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

ADULTE (>15 ans): Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.