

Gravité FAIBLE

Source : MedlinePlus / NIH

FaibleMoyenneGrave

## Définition

Rougeur oculaire

## Symptômes

Œil rouge larmoiement sensation irritation

## Causes

Multifactoriel

## Complications

Complications possibles selon sévérité

## Traitement

Traitement adapté

## Diagnostic différentiel

Diagnostic différentiel selon contexte clinique

## Examens paracliniques

Bilan biologique et imagerie adaptés

## Protocole médicamenteux

Traitement étiologique et symptomatique

## Interprétation des examens

Interpréter les résultats en corrélation avec la clinique Valeurs normales à vérifier selon les normes du laboratoire

Répéter les examens si résultats discordants avec la clinique

## ☐☐ **Prise en charge hospitalière**

Prise en charge ambulatoire      consultation de contrôle à 7-14 jours

Éducation thérapeutique du patient et de l'entourage      Planification du suivi post-hospitalisation et prévention des récives

## ☐☐☐☐☐ **Protocole par tranche d'âge**

**NOURRISSON (<2 ans):** Posologies en mg/kg strictes, vérifier poids exact; Voie orale sirop/suspension privilégiée; Surveillance déshydratation (pli cutané, fontanelle); Paracétamol 15mg/kg/6h (max 60mg/kg/j); PAS d'aspirine; Hospitalisation au moindre doute

**ENFANT (2-15 ans):** Posologies adaptées au poids (mg/kg); Formes galéniques: sirop, comprimés dispersibles, sachets; Paracétamol 15mg/kg/6h; Ibuprofène 10mg/kg/8h si >3 mois; Surveillance croissance et développement; Vaccination à jour

**ADULTE (>15 ans):** Posologies standard; Vérifier interactions médicamenteuses; Adaptation si insuffisance rénale (DFG) ou hépatique (Child-Pugh); Grossesse: vérifier CI; Sujet âgé >75 ans: réduire posologies de 25-50%, surveillance rénale

⚠ **Avertissement** : ⚠ GestuKay est une application informative et ne remplace pas un avis médical professionnel. Consultez toujours un médecin qualifié pour tout problème de santé.